

Artrin[®]

Plus

Recomendado en:

- Caninos, para el tratamiento de las enfermedades articulares degenerativas graves, tanto en su fase inicial como en el que se presente una agudización del dolor característico de las mismas.



Antiinflamatorio.
Analgésico.
Condoprotector
Regenerador del
cartílago articular

ALTA
PALATABILIDAD



Artrin[®] Plus

Antiinflamatorio.
Analgésico.

Condoprotector
Regenerador del
cartílago articular

la combinación más práctica y efectiva,
AL PROPORCIONAR 2 TRATAMIENTOS EN UN SOLO PRODUCTO

BROUWER

DURACIÓN DEL TRATAMIENTO

En términos generales se recomienda un tratamiento de 8 días.

Tratamientos más prolongados pueden maximizar el beneficio sobre la masa muscular, pero la duración del tratamiento siempre debe ser definida por el médico veterinario.

Luego del tratamiento con ARTRIN PLUS se debe continuar con ARTRIN y retomar con ARTRIN PLUS cada vez que manifieste dolor

DOSIS, VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE USO

Puede sugerirse el siguiente esquema de dosificación de acuerdo a rangos de pesos en caninos:

Entre 3 y 7.5 kg de peso: 1/4 comprimido cada 24h.

Entre 8 y 15 kg de peso: 1/2 comprimido cada 24h.

Entre 15 y 25 kg de peso: 3/4 comprimido cada 24h.

Pesos mayores a 25 kg: 1 comprimido cada 24h.

ALTA TOLERANCIA AL TRATAMIENTO
SIN EFECTOS COLATERALES DE NINGÚN TIPO

fórmula

Carprofeno 110 mg
Glucosamina sulfato 500 mg
Condroitín sulfato 100 mg
Manganeso 10 mg
Excipientes c.s.p 2000 mg



ALTA
PALATABILIDAD



18 COMPRIMIDOS
PALATABLES

