



ACEDERM

El corticoide inteligente



BROUWER 



ANCE



El corticoide inteligente

Calma el prurito de manera segura

Metabolismo a nivel dermal

Acederm contiene aceponato de hidrocortisona, un dermocorticoide que, formulado con los vehículos adecuados, penetra, actúa y se metaboliza en la piel. Esta es la clave de su seguridad, bajos efectos adversos y práctico régimen posológico (una aplicación diaria).

Diferente de los demás corticoides


Otros corticoides (orales, inyectables y tópicos) alcanzan altas concentraciones en sangre, que ocasionan riesgo de efectos colaterales. Acederm, al metabolizarse en las estructuras de la piel, posee una absorción sistémica extremadamente baja.

El primero en el país

Acederm es el primer aceponato de hidrocortisona disponible dentro del mercado argentino. Ahora, la evolución para el tratamiento del prurito, a su alcance.

DERM

¿Cómo actúa Acederm?



Seguridad publicada

70
DÍAS


Publicaciones internacionales hacen referencia a la seguridad en el uso del aceponato de hidrocortisona a una concentración de 0,584 mg/ml (la misma concentración que ofrece Acederm) durante 70 días en las zonas afectadas. El esquema posológico aplicado fue de 28 días consecutivos y -pasado este período- se disminuyó a día por medio durante 42 días.

DERM

La seguridad de Acederm, puesta a prueba

56
DÍAS

Acederm fue aplicado sobre 1/3 de la superficie corporal de los animales que participaron del estudio. **La evaluación a los 56 días fue:**




Esquema posológico: 1 aplicación diaria, durante los primeros 7 días.
1 aplicación diaria, 2 veces por semana.

Eficacia visible

En un ensayo clínico, Acederm fue administrado en animales con intenso prurito, principalmente en perros alérgicos. También fueron incluidos pacientes con otras dermatopatías pruriginosas.

Disminución del prurito durante el tratamiento



Observaciones realizadas por el M.V. Miguel Scarpa y el Vet. Lisandro Reyes.

ACEDERM

Fórmula

Hidrocortisona aceponato 0,584 mg

Agentes de formulación, c.s.p..... 1 ml

Posología

El producto se administra sobre la piel y no requiere de masajes tras su aplicación. La aspersión se debe realizar a una distancia de 10 cm de la zona a tratar. La dosis recomendada por día es de 1,52 μ g de hidrocortisona aceponato por cada cm^2 de piel afectada. Esta dosis puede obtenerse con dos pulsaciones del pulverizador sobre la superficie a tratar (equivalente a un cuadrado de 10 cm x 10 cm).

Se recomienda la administración diaria durante un período de 7 días. De acuerdo al origen de la dermatitis -inflamatoria o prurítica- el tratamiento podrá continuarse bajo criterio del médico veterinario actuante.

Presentación

Envase con tapa y con bomba aspersora anexa. Contiene 20 ml, que equivalen a 153 aspersiones.

