



OCLADERM

Controla y
elimina el prurito



BROUWER



OCLADERM[®]

Oclacitinib

¿Por qué controlar el prurito?

Ocladerm[®] está indicado para el tratamiento del prurito, que puede estar asociado a diversas causas:

-  **Alergias por picaduras de pulgas.**
-  **Alergias alimentarias.**
-  **Alergias de contacto.**
-  **Alérgenos ambientales como el polen, el moho o los ácaros del polvo.**

Cuando el prurito no es controlado -o está mal controlado- da lugar a un círculo vicioso de rascado o lamido, que lleva a lesionar áreas de piel sanas o agravar lesiones por causas primarias, que luego resultan contaminadas por la flora banal bacteriana o micótica y complican el cuadro.

Es importante lograr cortar el prurito en etapas tempranas de la enfermedad... ¡y en el corto plazo! Así, se evitan autolesiones y se instaura un tratamiento primario de la causa de base (si esta ha sido diagnosticada).

Ocladerm[®] mejora el bienestar y evita las lesiones autoinflingidas, que generan -a su vez- más molestia y prurito.



¿Por qué elegir Ocladerm®?

Ocladerm® tiene una rápida acción: luego de su administración, disminuye el prurito a partir de las 4 horas.

Se realizó un ensayo* con 37 perros con dermatitis atópica severa y prurito mayor a 5 (escala comportamental de prurito). Ocladerm® y el producto de referencia, que contienen el mismo principio activo, fueron administrados a la dosis recomendada por vía oral por 42 días.

Al finalizar el estudio, todos los animales manifestaron un prurito promedio cercano a 2 (equivalente a prurito muy leve, solo episodios ocasionales de rascado) y no se observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos productos. Es decir, que se comprobó la eficacia de Ocladerm®.

0 - Sin prurito

Perro normal, sin picazón

1-2 / Muy leve

Rascado solo ocasionalmente. Tiene un poco más de picazón que antes del inicio del problema de la piel

3-4 / Leve

Un poco más frecuente. No se rasca cuando duerme, está comiendo, jugando o haciendo ejercicio o distraído

5-6 / Moderado

Episodios regulares de picazón, incluso nocturno (si se observa) pero no mientras está comiendo, jugando o haciendo ejercicio o distraído

7-8 / Intenso

Episodios prolongados de picazón, incluso nocturno (si se observa) también mientras está comiendo, jugando o haciendo ejercicio o distraído

9-10 / Muy intenso

Casi continuo. No para de rascarse pase lo que pase, incluso en el consultorio (el prurito necesita ser físicamente restringido)

¿Cómo actúa Ocladerm®?

Ocladerm® contiene oclacitinib, que es un inhibidor de la Janus quinasa (JAK). Específicamente, actúa inhibiendo la JAK 1 y 3; además, tiene actividad limitada contra un amplio rango de receptores celulares de superficie, canales iónicos, transportadores y otras enzimas intracelulares.

JAK 1 y 3 son isoenzimas que cumplen un rol crucial en la transducción de varias citoquinas diana proinflamatorias, proalérgicas y propruriginosas.

Por el contrario, el oclacitinib tiene baja afinidad por JAK 2, isoenzima con acciones fisiológicas.

*Referencia trabajo técnico:

Evaluación de Eficacia de Ocladerm® en Caninos.

Investigador principal: Dr. Pablo Manzuc.

Investigadores asociados: Dra. Silvana Álvarez, Dra. Jesica Grandinetti,

Dr. Lisandro Reynes y Dr. Miguel Scarpa.





● ¿Cuándo administrar Ocladerm®?

Para el **tratamiento del prurito** asociado a la dermatitis alérgica y control de las manifestaciones clínicas de la dermatitis atópica en perros (a partir de los 12 meses de edad).

¿Cuál es la dosificación adecuada?

Ocladerm® debe administrarse a razón de 0,4 – 0,6 mg de oclacitinib/kg de peso corporal, por vía oral, en dosis de ataque, dos veces por día (cada 12 horas) durante 14 días. Luego, se debe pasar a una dosis de mantenimiento de una toma diaria (0,4-0,6 mg/kg cada 24 horas). El comprimido se puede administrar con o sin el alimento.

La duración del tratamiento a largo plazo será variable según la evolución del cuadro clínico y criterio del médico veterinario actuante.




Rango de peso (kg)	Comprimido x 3,6 mg	Comprimido x 5,4 mg	Comprimido x 16 mg
3,0 - 4,4	1 comprimido		
4,5 - 5,9		1 comprimido	
6,0 - 8,9	2 comprimidos		
9,0 - 13,4		2 comprimidos	
13,5 - 19,9			1 comprimido
20,0 - 26,9		2 comprimidos	
27,0 - 39,9			2 comprimidos
40,0 - 54,9			3 comprimidos
55,0 - 80,0			4 comprimidos

Los comprimidos de **Ocladerm®** son monoranurados (para ser divididos en mitades). Esto garantiza la homogeneidad del principio activo en las dos fracciones del comprimido.

6 
semanas

Evolución del prurito medido por promedios de escala comportamental



Ocladerm®



Producto de referencia

En ninguno de los puntos se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos productos

Línea dermatológica Brouwer



OCLADERM®



ACEDERM®



DERMOMAX®

Control del prurito.

Control del prurito.

Control de lesiones localizadas en piel de etiología diversa (inflamatorias, pruriginosas, infecciosas).



Indicaciones



¿A quién indicarlo?

Pacientes con prurito leve, moderado e intenso, pero en ausencia de inflamación y eritema o con la inflamación controlada.

Pacientes con prurito con presencia de inflamación en el área donde se produce el rascado. Particularmente útil cuando el proceso es localizado (orejas, axilas, lamido acral, etc.).

Pacientes con lesiones localizadas en piel, con presencia de inflamación, prurito o infección.



¿Por qué?

El oclacitinib actúa solamente contra las interleuquinas (principalmente IL 31 que se producen a partir de las 48/72 h de iniciado el proceso inflamatorio). No actúa contra los mediadores químicos que se liberan durante la fase aguda de la inflamación (ej. histamina).

El aceponato de hidrocortisona es un corticoide de acción local. Actúa contra todos los mediadores químicos liberados en el proceso de inflamación aguda.

La combinación de antibióticos (gentamicina), antimicóticos (clotrimazol), antiinflamatorios (betametasona), anestésicos locales (lidocaína) y vitamina A (como estimulante de la cicatrización) permiten controlar un amplio espectro de lesiones cutáneas de etiología diversa.



¿Cuándo?

- Para el control a largo plazo del prurito en ausencia de inflamación aguda.

- Cuando el paciente se presenta con eritema, rojo en las áreas de rascado, lo que indica un proceso de inflamación aguda.
- En pacientes controlados que presentan un pico de reagudización del prurito.
- Periódicamente, para reforzar el tratamiento con oclacitinib en áreas particularmente sensibles como orejas, axilas o los lugares en los cuales cada paciente en particular tiene tendencia a comenzar a rascarse.

- En lesiones leves y localizadas, sobre todo cuando existe un componente bacteriano o micótico



Otros usos

Puede evaluarse su uso también en tratamientos de problemas de origen inmunomediados como lupus, pénfigo, vasculitis de margen auricular, vasculitis post inyectable, fistulas perianales.



Ventajas

Su gran margen de seguridad y escasos efectos colaterales permiten realizar tratamientos prolongados, esenciales en estos pacientes de enfermedades crónicas como la alergia.

Al ser de acción localizada y de escasa absorción más allá de la dermis, carece de los efectos colaterales de otros corticoides.

Amplio espectro.



La terapia conjunta de
Ocladerm y Acederm
constituye **la combinación ideal**
para controlar el proceso alérgico

La asociación de **Ocladerm**® con **Acederm**® permite controlar mejor el prurito en los picos agudos de estos procesos crónicos. Los mecanismos de acción de **Ocladerm**® –que actúan sobre las interleuquinas en el inicio del proceso inflamatorio– y **Acederm**®, –que actúan sobre los mediadores de la inflamación– se complementan y permiten asegurar un control más eficaz. **Ambas drogas se potencian al actuar conjuntamente.** **Acederm**® puede ser utilizado previamente para disminuir el eritema en las zonas de rascado, y luego, continuar con **Ocladerm**® para controlar de forma eficaz y rápida el proceso alérgico.



Estuches con 20 comprimidos.

Escaneá este código para
descargar el prospecto de
Ocladerm



OCLADERM

Fórmula:

Cada comprimido de 103 mg contiene 3,6 mg de oclacitinib como oclacitinib maleato.
Cada comprimido de 154 mg contiene 5,4 mg de oclacitinib como oclacitinib maleato.
Cada comprimido de 457 mg contiene 16 mg de oclacitinib como oclacitinib maleato.

Advertencias o interacciones

- No usar en casos de hipersensibilidad al oclacitinib.
- No usar en perros menores de 12 meses de edad o de menos de 3 kg de peso.
- No usar en perros con inmunosupresión o hiperadrenocorticismos.
- No usar en perras gestantes o en lactación, pues no han sido estudiados los efectos del oclacitinib en estos estados (ni en machos destinados a la reproducción).

Ocladerm® modula el sistema inmune y puede incrementar la susceptibilidad a infecciones y desarrollo de papilomas.



Contiene 20 ml que equivalen a 153 aspersiones.

Escaneá este código para
descargar el prospecto de
Acederm



ACEDERM

Fórmula:

Hidrocortisona aceponato.....0,584 mg
Agentes de formulación, c.s.p.1 ml

Indicaciones

Acederm está indicado en el tratamiento de las dermatitis inflamatorias y pruríticas del perro.
Antipruriginoso, antiinflamatorio.
Solución de aceponato de hidrocortisona de administración tópica



Pomo conteniendo 15 ó 40 gramos.

Escaneá este código para
descargar el prospecto de
Dermomax

Nuevo diseño de packaging disponible próximamente



DERMOMAX

Fórmula:

Cada 100 g contiene
Gentamicina Base (como sulfato).....0,12 g
Clotrimazol.....1,00 g
Betametasona-17-valerato.....0,12 g
Lidocaína base (como clorhidrato).....0,50 g
Vitamina A Palmitato.....0,06 g*
Agentes de formulación, c.s.p.....100,00 g

* Equivalente a 100.000 UI de Vitamina A

Dosis

Aplicar una capa delgada sobre el área de piel a tratar 2 a 4 veces por día dependiendo de la etiología de las patologías a tratar.